



PERÚ:

Indicadores de Resultados de los Programas Presupuestales

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

Primer Semestre 2025

(Resultados al 50% de la muestra)



CONTENIDO

01

Desnutrición, anemia y consumo de hierro

02

Inmunizaciones, control de crecimiento y desarrollo

03

Enfermedades prevalentes y consumo de agua

04

Atención materno neonatal

05

Violencia contra la mujer

06

Acceso a la identidad

07


Resumen metodológico



Desnutrición, anemia,
consumo de hierro,
lactancia, bajo peso,
nacimiento prematuro



MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA, 2009 – 2025 | Semestre P/ Patrón de referencia OMS (Porcentaje)




P/ Preliminar al 50% de la muestra.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.



MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA, 2009 – 2025 | Semestre P/ Patrón de referencia OMS (Porcentaje)






NIÑOS DE 6 A 35 MESES DE EDAD CON ANEMIA, 2009 – 2025 I Semestre P/

(Porcentaje)

RM 363-2022-MINSA

Periodo: 2025 – I /2024



P/ Preliminar al 50% de la muestra.


RM 363-2022-MINSA; RJ 090-2012-J-OPE/INS; Croft, Trevor N., Allen, Courtney K., Zachary, Blake W., et al. 2023. Guide to DHS Statistics. Rockville, Maryland, USA: ICF. La formula de ajuste por altitud y los puntos de corte se mantienen desde el inicio de la medición de la anemia en el país por el INEI (1996).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar



NIÑOS DE 6 A 35 MESES DE EDAD CON ANEMIA, 2009 – 2025 I Semestre P/ (Porcentaje)


RM 363-2022-MINSA





NIÑOS DE 6 A 35 MESES DE EDAD CON ANEMIA, 2015 – 2025 I Semestre P/ (Porcentaje)

NUEVA DIRECTRIZ OMS 2024 / RM 251-2024-MINSA




NUEVA DIRECTRIZ OMS 2024 / RM 251-2024-MINSA reduce el punto de corte de la hemoglobina de 11 g/dL a 10.5 g/dL al grupo de 6 a 23 meses y modifica los ajustes de la hemoglobina a partir de los 500 msnm, realizando un menor ajuste (descuento) por encima de 3500 msnm



NIÑOS DE 6 A 35 MESES DE EDAD CON ANEMIA, 2015 – 2025 I Semestre P/ (Porcentaje)


NUEVA DIRECTRIZ OMS 2024 / RM 251-2024-MINSA

Área de Residencia






NIÑOS DE 6 A 35 MESES DE EDAD QUE CONSUMIERON SUPLEMENTO DE HIERRO EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS, 2009 – 2025 I Semestre P/ (Porcentaje)



Formas de presentación del Suplemento de hierro 2025 - I P/



Nota: Se indaga el consumo de suplemento de hierro en los últimos 7 días anteriores a la entrevista.


P/ Preliminar al 50% de la muestra

* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.




MENORES DE 6 MESES DE EDAD CON LACTANCIA MATERNA, 2009 – 2025 I Semestre P/ (Porcentaje)



La Lactancia Materna es considerada como el único alimento capaz de satisfacer las necesidades nutricionales durante los primeros seis meses de vida.



NIÑOS CON INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER, 2009 – 2025 I Semestre P/ (< 2,5 Kg) (Porcentaje)




P/ Preliminar al 50% de la muestra

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.



NACIDOS VIVOS CON EDAD GESTACIONAL MENOR DE 37 SEMANAS, 2009 – 2025 I Semestre P/ (Porcentaje)



P/ Preliminar al 50% de la muestra

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.



Inmunizaciones y Control de Crecimiento y Desarrollo



NIÑOS CON VACUNAS DE ACUERDO A SU EDAD, 2014 – 2025 | Semestre P/ (Porcentaje)

Según Esquema de vacunación NTS N° 141-MINSA/2018/DGIESP



P/ Preliminar al 50% de la muestra

1/ Vacunas de acuerdo a su edad incluye 1 dosis de BCG, 3 dosis de Pentavalente, 3 dosis de Polio, 2 dosis de Rotavirus y 2 dosis de Neumococo


2/ Vacunas de acuerdo a su edad incluye 1 dosis de BCG, 3 dosis de Pentavalente, 3 dosis de Polio, 2 dosis de Rotavirus y 3 dosis de Neumococo y 1 dosis de SPR

3/ Vacunas de acuerdo a su edad incluye 1 dosis de BCG, 3 dosis de Pentavalente, 3 dosis de Polio, 2 dosis de Rotavirus y 3 dosis de Neumococo, 2 dosis de SPR, 1 dosis de refuerzo de DPT

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.



NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO (CRED) COMPLETO PARA SU EDAD, 2017 – 2025 I Semestre P/ (Porcentaje)



Nota:

P/ Preliminar al 50% de la muestra

Se indaga con la madre por el número de controles de crecimiento que tuvo el niño desde su nacimiento, validándose con el carné de atención integral de salud del niño

* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.



Enfermedades prevalentes y consumo de agua



NIÑOS MENORES DE 36 MESES DE EDAD QUE TUVIERON ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (EDA), 2009 – 2025 I Semestre P/ (Porcentaje)




P/ Preliminar al 50% de la muestra

* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.



NIÑOS MENORES DE 36 MESES DE EDAD QUE TUVIERON INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA), 2009 – 2025 I Semestre P/ (Porcentaje)




P/ Preliminar al 50% de la muestra

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.



HOGARES CON ACCESO A AGUA TRATADA, 2009 – 2025 I Semestre P/ (Porcentaje)



P/ Preliminar al 50% de la muestra


a/ resultados obtenidos de entrevista presencial

Agua tratada: Agua obtenida de red pública o agua que no proviene de red pública pero que recibe tratamiento antes de consumirla: Hervida, con cloro, con desinfección solar o agua embotellada

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.



HOGARES CON SANEAMIENTO BÁSICO, 2009 – 2025 I Semestre P/ (Porcentaje)



Saneamiento Básico es la disponibilidad de instalaciones sanitarias tales como baño, letrina, etc, son factores importantes para el control de enfermedades y mejora de la salud.

P/ Preliminar al 50% de la muestra.

Saneamiento básico: Servicio higiénico conectado a red pública de desagüe dentro de la vivienda o fuera de la vivienda, pozo séptico o letrina.

a/ Resultados obtenidos de entrevista presencial.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.




Atención materno neonatal



GESTANTES QUE RECIBIERON SU PRIMER CONTROL PRENATAL EN EL PRIMER TRIMESTRE DE GESTACIÓN, 2009 – 2025 | Semestre P/

En los 5 años antes de la encuesta
(Porcentaje)




P/ Preliminar al 50% de la muestra.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.



GESTANTES QUE EN EL ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA RECIBIERON SEIS O MÁS CONTROLES PRENATALES, 2009 – 2025 I Semestre P/ (Porcentaje)




P/ Preliminar al 50% de la muestra.

* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.



PARTO INSTITUCIONAL DEL ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA, 2009 – 2025 I Semestre P/ (Porcentaje)




P/ Preliminar al 50% de la muestra.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.



GESTANTES QUE CONSUMIERON SUPLEMENTO DE HIERRO EN EL ÚLTIMO NACIMIENTO ANTERIOR A LA ENCUESTA, 2009 – 2025 I Semestre P/ (Porcentaje)




P/ Preliminar al 50% de la muestra.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.



NACIMIENTOS POR CESÁREA DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA, 2009 – 2025 I Semestre P/ (Porcentaje)




P/ Preliminar al 50% de la muestra.

* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.



MUJERES EN UNIÓN QUE USAN ACTUALMENTE ALGÚN MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, 2009 – 2025 I Semestre P/ (Porcentaje)



P/ Preliminar al 50% de la muestra.


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.



MUJERES EN UNIÓN CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, 2009 – 2025 I Semestre P/ (Porcentaje)

Periodo: 2025 - I /2024

-0,8 p.p.



P/ Preliminar al 50% de la muestra.

a/Resultados obtenidos de entrevista presencial



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.



Violencia contra la mujer



VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE 15 A 49 AÑOS, EJERCIDA ALGUNA VEZ POR EL ESPOSO O COMPAÑERO, 2009 – 2025 | Semestre P/ (Porcentaje)



P/ Preliminar al 50% de la muestra.

1/ Respuesta Múltiple

a/ Resultados obtenidos de entrevista presencial.


* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.



VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, EJERCIDA POR EL ESPOSO O COMPAÑERO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, 2018 – 2025 | Semestre P/

(Porcentaje)



P/ Preliminar al 50% de la muestra.

a/ Resultados obtenidos de entrevista presencial

1/Respuesta Múltiple

* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.



Acceso a la Identidad



NIÑOS DE 6 A 59 MESES QUE NO ESTÁN INSCRITOS EN LA MUNICIPALIDAD/ RENIEC, 2009 – 2025 | Semestre P/ (Porcentaje)





Resumen Metodológico



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR, 2025 I Sem P/



COBERTURA GEOGRÁFICA

A Nivel nacional, en las 24 regiones del país y la Provincia Constitucional del Callao
Periodo: Enero-Junio 2025



MARCO MUESTRAL

Censos Nacionales XII de Población y VII de Vivienda del año 2017 (CPV 2017), y el material cartográfico actualizado para tal fin en el proceso previo al inicio de la encuesta.



NIVELES DE INFERENCIA

- ✓ Nacional
- ✓ Área de residencia: Urbano y Rural
- ✓ Región natural : Lima Metropolitana, resto Costa, Sierra y Selva



POBLACIÓN OBJETIVO

- ✓ Los hogares particulares, sus miembros: residentes habituales y los que pernoctaron la noche anterior.
- ✓ Mujeres de 12 a 49 años
- ✓ Niños menores de 5 años
- ✓ Personas de 15 años a más
- ✓ Niños menores de 12 años



TAMAÑO DE LA MUESTRA

18 370 viviendas en
1 627 conglomerados



TIPO DE CUESTIONARIO

Entrevista directa a través de dispositivos móviles (Tablet)

- ✓ Cuestionario del Hogar (Jefe/a del hogar o persona de 18 y más años de edad)
- ✓ Cuestionario Individual (Mujeres de 12 a 49 años de edad)
- ✓ Cuestionario de Salud (Personas de 15 años y más de edad)



 www.gob.pe/inei