

PERÚ :

ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR

2025






CONTENIDO

- 1 **Salud Materno Neonatal y Salud Reproductiva**
 - 2 **Nutrición, Vacunación y Desarrollo Infantil Temprano**
 - 3 **Prevalencia de Sobrepeso y Obesidad**
 - 4 **Violencia Familiar**
-

I



SALUD MATERNO NEONATAL Y SALUD REPRODUCTIVA

PERÚ: GESTANTES QUE RECIBIERON SU PRIMER CONTROL PRENATAL EN EL PRIMER TRIMESTRE DE GESTACIÓN





Nota:
 1/ Comprende los 43 distritos de la provincia de Lima.
 2/ Comprende las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.
 * Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$)
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

PERÚ: GESTANTES QUE EN EL ÚLTIMO NACIMIENTO RECIBIERON SEIS O MÁS CONTROLES PRENATALES





Nota:
 1/ Comprende los 43 distritos de la provincia de Lima.
 2/ Comprende las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.
 * Diferencia significativa (p<0.10); ** Diferencia altamente significativa (p<0.05); *** Diferencia muy altamente significativa (p<0.01)
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

PERÚ: GESTANTES QUE CONSUMIERON SUPLEMENTO DE HIERRO EN EL ÚLTIMO NACIMIENTO ANTERIOR A LA ENCUESTA




Nota:
 1/ Comprende los 43 distritos de la provincia de Lima.
 2/ Comprende las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.
 * Diferencia significativa (p<0.10); ** Diferencia altamente significativa (p<0.05); *** Diferencia muy altamente significativa (p<0.01)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

PERÚ: PARTO INSTITUCIONAL DEL ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA





Nota:
 1/ Comprende los 43 distritos de la provincia de Lima.
 2/ Comprende las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.
 * Diferencia significativa (p<0.10); ** Diferencia altamente significativa (p<0.05); *** Diferencia muy altamente significativa (p<0.01)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

PERÚ: NACIMIENTOS POR CESÁREA



Lugar del Parto



Nota: Se incluyen todos los nacimientos en los últimos cinco años anteriores a la encuesta.

1/ Comprende los 43 distritos de la provincia de Lima.


2/ Comprende las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$)


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

PERÚ: MUJERES EN UNIÓN CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

El indicador de demanda insatisfecha de planificación familiar mide el porcentaje de mujeres actualmente unidas que desean limitar o espaciar los nacimientos, pero que no utilizan ningún método anticonceptivo.



PERÚ: MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN MUJERES DE 15 A 49 AÑOS ACTUALMENTE UNIDAS



Nota: Según Norma Técnica de Salud de Planificación Familiar – NTS N°124-2016-MINSA-V.01


El indicador hace referencia al uso actual de métodos anticonceptivos

1/ Incluye Dispositivo intrauterino (DIU), Método amenorrea por lactancia (MELA) y Anticoncepción oral de emergencia



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

PERÚ: TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD

Promedio de hijos por mujer




Tasas Específicas de Fecundidad, 2025
(Nacimientos por cada 1000 mujeres)




Nota:
1/ Comprende los 43 distritos de la provincia de Lima.
2/ Comprende las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.
* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

PERÚ: EMBARAZO ADOLESCENTE (12 A 17 AÑOS DE EDAD)



0,6%
Embarazadas por primera vez





1,7%
Ya son madres

II.

NUTRICIÓN, VACUNACIÓN Y DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

PERÚ: LACTANCIA MATERNA EN MENORES DE 6 MESES




1/ Comprende los 43 distritos de la provincia de Lima.

2/ Comprende las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar


PERÚ: PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA (PATRÓN OMS)



16,7%
Tienen madres con desnutrición



33,4%
Tienen madres sin nivel educativo

18,3%
No tratan el agua que beben





Nota: Niños menores de 5 años
 1/ Comprende los 43 distritos de la provincia de Lima.
 2/ Comprende las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

PERÚ: NIÑOS MENORES DE 36 MESES DE EDAD QUE TUVIERON INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA)



Nota:
 1/ Comprende los 43 distritos de la provincia de Lima.
 2/ Comprende las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.
 * Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$)
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar



PERÚ: NIÑOS MENORES DE 36 MESES DE EDAD QUE TUVIERON ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (EDA)



Nota:
 1/ Comprende los 43 distritos de la provincia de Lima.
 2/ Comprende las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.
 * Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$)
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar



PERÚ: PREVALENCIA DE ANEMIA EN NIÑOS DE 6 A 35 MESES DE EDAD

NUEVA DIRECTRIZ OMS 2024
RM 251-2024-MINSA



* Diferencia significativa (p<0.10); ** Diferencia altamente significativa (p<0.05); *** Diferencia muy altamente significativa (p<0.01)

PERÚ: NIÑOS DE 6 A 35 MESES DE EDAD QUE CONSUMIERON SUPLEMENTO DE HIERRO



Nota: Se indaga el consumo de suplemento de hierro en los últimos 7 días anteriores a la entrevista

1/ Comprende los 43 distritos de la provincia de Lima.


2/ Comprende las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$)


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

PERÚ: MENORES CON VACUNAS DE ACUERDO A SU EDAD


Menores de 12 meses



Menores de 24 meses



Menores de 36 meses



* Diferencia significativa (p<0.10); ** Diferencia altamente significativa (p<0.05);
 *** Diferencia muy altamente significativa (p<0.01)


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

Vacunas menores 12 meses: 1 dosis de BCG, 3 dosis de Pentavalente, 3 dosis de polio, 2 dosis de Rotavirus y 2 dosis de Neumococo.


Vacunas menores de 24 y 36 meses: 1 dosis de BCG, 3 dosis de Pentavalente, 3 dosis de polio, 2 dosis de Rotavirus, 3 dosis de Neumococo, 2 dosis de sarampión paperas y rubeola (SPR), 1 dosis de refuerzo de DPT, 1 dosis de refuerzo de Polio

PERÚ: MENORES CON VACUNAS DE ACUERDO A SU EDAD



Menores de 12 meses



Menores de 24 meses



Menores de 36 meses





1/ Comprende los 43 distritos de la provincia de Lima.

2/ Comprende las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

PERÚ: NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO (CRED) COMPLETO PARA SU EDAD





Nota:
 1/ Comprende los 43 distritos de la provincia de Lima.
 2/ Comprende las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.
 * Diferencia significativa (p<0.10); ** Diferencia altamente significativa (p<0.05); *** Diferencia muy altamente significativa (p<0.01)
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

PERÚ: NACIDOS VIVOS CON EDAD GESTACIONAL MENOR DE 37 SEMANAS




Nota:
 1/ Comprende los 43 distritos de la provincia de Lima.
 2/ Comprende las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.
 * Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$)
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

PERÚ: NIÑOS CON INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER



Nota:
 1/ Comprende los 43 distritos de la provincia de Lima.
 2/ Comprende las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.
 * Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$)
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

PERÚ: DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO



NACIMIENTO SALUDABLE

0 a 59 meses

Nacimiento prematuro **20,8%**

Bajo peso al nacer **7,9%**



APEGO SEGURO

9 a 12 meses

53,0%

Año 2024: 50,8% ↗




COMUNICACIÓN VERBAL EFECTIVA

9 a 36 meses

44,6%

Año 2024: 42,4% ↗




FUNCIÓN SIMBÓLICA

24 a 36 meses

45,9%

Año 2024: 42,9% ↗



ADECUADO ESTADO NUTRICIONAL

6 a 35 meses

Anemia (6 a 35 m) **34,9%**

Desnutrición crónica (menores de 36 m) **13,0%**




CAMINA SOLO

12 a 18 meses

60,4%

Año 2024: 61,5% ↘



REGULACIÓN DE EMOCIONES Y COMPORTAMIENTOS

24 a 71 meses

37,1%


Año 2024: 39,5% ↘

III.


PREVALENCIA DE SOBREPESO Y OBESIDAD

PERÚ: SOBREPESO Y OBESIDAD EN PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD

Sobrepeso




Obesidad




PERÚ: SOBREPESO Y OBESIDAD EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD

NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD





NIÑOS DE 36 A 59 MESES DE EDAD



IV.



VIOLENCIA FAMILIAR

PERÚ: VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE 15 A 49 AÑOS, EJERCIDA ALGUNA VEZ POR EL ESPOSO O COMPAÑERO



Nota:
 1/ Comprende los 43 distritos de la provincia de Lima.
 2/ Comprende las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.
 * Diferencia significativa (p<0.10); ** Diferencia altamente significativa (p<0.05); *** Diferencia muy altamente significativa (p<0.01)
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

PERÚ: VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, EJERCIDA POR EL ESPOSO O COMPAÑERO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES



Nota:
 1/ Comprende los 43 distritos de la provincia de Lima.
 2/ Comprende las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.
 * Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$)
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar



**PRODUCIENDO ESTADÍSTICAS PARA EL
DESARROLLO DEL PERÚ**

